

## FICHA TÉCNICA RATOZAN GRÃOS DOMÉSTICO

**INDICAÇÕES DE USO:** O raticida grãos cereais doméstico RATOZAN é um produto de pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

**COMPOSIÇÃO:** Brodifacum 0,005% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001% p/p, Atrativo e Corante.

**MODO DE USAR:**

- Colocar os grãos em caixa porta iscas, deixar próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**APRESENTAÇÃO:** Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)



**PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS:**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

- Mantenha o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não coloque este produto em utensílio de uso alimentar.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber, nem fumar.
- A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos.

**PRIMEIROS SOCORROS:**

- Depois de aplicar o produto, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

**RECOMENDAÇÕES:**

- Sempre que possível usar porta-iscas. Não havendo caixa porta iscas, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em seus caminhos.
- Aplicar o raticida fora das tocas ou das trilhas, além do risco inerente

ao produto, é uma perda econômica, porque os ratos não vão encontrar o produto.

**CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:**

- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- A limpeza de eventuais resíduos seja feita com uso de luvas, colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhando para destinação final adequada.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.

**CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:**

- Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco e ventilado.
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

Antônio Roldão de Souza  
CRQ 04420073-IV Reg.

**REGISTRO NO M.S.:**  
3.5685.0008.001-9

**INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:**

Grupo Químico: Cumarinico  
Nome Comum: Brodifacum  
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221  
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

