



FICHA TÉCNICA RATOZAN PÓ

INDICAÇÕES DE USO: O raticida pó de contato RATOZAN é formulado com Cumatetrailil e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira. O pó adere à pelagem do roedor que, na tentativa de se limpar, acaba ingerindo o raticida. RATOZAN tem como ação tóxica a fragilidade capilar, provocando hemorragias internas, que levam os roedores a morte de forma lenta, fazendo com que os outros roedores não desconfiem do tratamento de controle que esta sendo realizado.

COMPOSIÇÃO: Cumatetrailil 0,75% p/p, Benzoato de Denatônio 0,002% p/p, Corante CI 42090 e Veículo.

MODO DE USAR: Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais onde eles possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Recomenda-se reaplicar o produto até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.

APRESENTAÇÃO: Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Manter o produto na embalagem original;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;
- Só utilize em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos;
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos;
- Não comer, beber nem fumar;
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos;
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente;
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Em caso de ingestão não provoque vômito.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Usar luvas, máscara e proteção ocular;
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza;
- Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: **PISO** - Fazer barreira de contenção com objetos que impeçam o vazamento do produto, em seguida, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar e identificar. **CORPOS D'ÁGUA:** Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da

empresa. Observar a legislação estadual e municipal vigente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para destinação final.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA:

- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes;
- Não se deve contaminar os cursos de água;
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos;
- Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos voláteis e do ativo no ambiente;
- Método preferencial do descarte da embalagem vazia é a incineração através da queima ou do lixo tóxico autorizado;
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado e coberto, sem abrigo do sol e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0017.001-8

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Cumatetrailil
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Toxicológicas: 0800-0148110

